GUÍA TRATAMIENTOS DE LA VID Y EL PARRAL

Fotos: J.J. Pérez de Obanos (EVENA)

	YEMA DE INVIERNO	YEMA DE ALGODÓN	PUNTA VERDE	SALIDA DE HOJAS	SALIDAS EXTENDIDAS	RACIMOS VISIBLES	RACIMOS SEPARADOS	BOTONES FLORALES SEPARADOS	FLORACIÓN	CUAJADO	GRANO TAMAÑO GUISANTE	INICIO DEL ENVERO	MADURACIÓN	
EXCORIOSIS *(Phomopsis viticola)* **BLACK-ROT** *(Guignardia bidwellii)*					COBRE NORDOX 75 70 - 150 g/hl ; 700 - 900 g/ha +	QUIMAZUFRE 80 WG (500 g/hl - 2,5 kg/ha)								Eficaces también contra MILDIU de primavera
					SPORAMIL CMX (0,27 Kg/ha)									
MILDIU *(Plasmopara viticola)* **ANTRACNOSIS** *(Gloesporium ampelophagum)*				ALEXIN 75 LS (2-4 l/ha)										Seguir avisos de los S.P.V. Pueden mezclarse con **ALEXIN®75 LS** excepto los que contienen oxicloruro de Cu
					SPONSOR® COMBI WG (200 g/hl - 2 Kg/ha)									
							FOLPERAN (1,8 Kg/ha uva vinificación ; 2 Kg/ha uva mesa) Aplicar hasta BBCH 60 en uva de mesa							
									RECITAL (250/300 g/hl - 2,5 kg/ha)					
					COBRE NORDOX 75 (70 - 150 g/hl; 700 - 900 g/ha)					COBRE NORDOX 75 (70 - 150 g/hl; 700 - 900 g/ha)				
					COBRE NORDOX 50 (80 - 700 g/hl; 1 - 1,4 kg / ha)					COBRE NORDOX 50 (80 - 700 g/hl; 1 - 1,4 kg/ha)				
					NORDOX ENERGY (1 kg/ha)					NORDOX ENERGY (1 kg/ha)				
				ALIADO CF (0,9 l/ha)						ALIADO CF (0,9 l/ha)				
OIDIO o CENIZA *(Erysiphe necator)*					TAIGA (0,4 l/ha)									**TACTIC®** es frenante de excoriosis, BLACK-ROT y BOTRYTIS **TAIGA®** es frenante de BOTRYTIS **KINDRED®** está especialmente recomendado para estrategias anti-resistencia. Usar con temperaturas de 5-35ºC.
					TACTIC (0,15 - 0,2 kg/ha)					TACTIC (0,15 - 0,2 kg/ha)				
					TARMILO (0,75 l/ha)									
					QUIMAZUFRE (200 - 500 g/hl ; 1 - 7,5 kg/ha)					QUIMAZUFRE (200 - 500 g/hl ; 1 - 7,5 kg/ha)				
			KINDRED (30-600 cc/hl ; 0,06-0,60 l/ha)							KINDRED (30-600 cc/hl ; 0,06-0,60 l/ha)				
					ABIR (0,3-1,3 l/ha uva mesa; 0,1-0,8 l/ha vinificación)					ABIR (0,3-1,3 l/ha uva mesa; 0,1-0,8 l/ha vinificación)				
NECROSIS BACTERIANA *(Xanthomonas ampelina)* **PODREDUMBRE ÁCIDA**					COBRE NORDOX® 75 (70 - 150 g/hl ; 700 - 900 g/ha)					COBRE NORDOX® 75 (70 - 150 g/hl ; 700 - 900 g/ha)				
PIRAL *(Sparganothis pilleriana)* **GUSANO GRIS** *(Agrotis segetum)* **ALTICA** *(Haltica lythri)* **CIGARRERO** *(Bycticus betulae)*			AKIRA WG 400 - 800 g/hl ; 0,4 - 0,8 kg/ha / AKIRA PLUS (75-150 cc/ha)											Contra GUSANOS GRISES tratar preferentemente al atardecer. **AKIRA®** es eficaz contra los PULGONES.
MELAZO *(Pseudococcus citri)* *(Eulecanium, Pulvinaria)*			NOMINAL (50 - 75 cc/hl ; 0,25 - 0,75 l/ha)											
POLILLAS *(Lobesia botrana)*								MASSOMETRIN EC (40 - 60 cc/hl ; 0,4 - 0,6 l/ha)						
									BACTUR 2X (50 - 100 g/hl ; 0,5 kg - 1 kg/ha) / BIOBIT 32 (0,5 - 1 kg/ha)					
										SUMICIDIN EXTRA EW (0,2-0,3 l/ha)				
										AKIRA WG 400 - 800 g/hl ; 0,4 - 0,8 kg/ha / AKIRA PLUS (75 - 150 cc/ha)				
CICADELIDOS *(Empoasca vitis)* *(Scaphoideus titanus)*								CORDIAL EXTRA (64 cc/hl ; 0,96 l/ha)						Seguir los avisos de S.P.V. Estos tratamientos son también eficaces contra POLILLAS si coinciden en el tiempo.
						TALITA (20 cc/hl ; 40 cc/ha)								
										AKIRA WG 400-800 g/hl ; 0,4-0,8 kg/ha / AKIRA PLUS (75-150 cc/ha)				
TRIPS			LALGUARD M52 (1,25 l/ha)							LALGUARD M52 (1,25 l/ha)				
MALAS HIERBAS		ACTIVUS SC (3-5 l/ha)								LOGRADO 360 (1,5 - 10 l/ha)				Si en el momento de aplicar el preemergente hay presencia de hierbas añadir **LOGRADO 360/INTRUDER 360.** Dosis según forma de aplicación (consultar).
	MAXOFEN EC (0,6 l/ha)									INTRUDER 360 (3 - 10 l/ha)				
		HERBANOL (0,2 kg/ha) aplicar entre líneas, no superando 1/3 de la parcela									DIXON (0,5 - 2 l/ha)			
			WINSHOT (4-6 l/ha)											
OTROS					ABRIC 2-5 l/ha / AZUR 4-5 Kg/ha / URTICA CHT 2-6 l/ha / EQUISETUM CHT 2-5 l/ha / WELGRO Cu +Zn 0,5 Kg/ha / PANEL DÚO 1-2 Kg/ha									
FITOREGULADORES						FLORGIB 4 L (75 ml/ha)								
										SITOFEX (125-250 ml/ha)				